Vass8R07s111-115

Vass8R07s111-115

Vass8R07s111-115

Vass8R07s111-115

Vass8R07s111-115

ulantanlantanlantanlantanl

Juntanifanti adestrado da alco

Graciana 8 R7 s-111-115



NOM graciana

EMPLACEMENT. 8 R7 A MI. MS

		100										
ouche	Nbre		urement mi/děb		Ferti-	Flor	mi/E			raison mi/v	fin	Maturit€
1 2 4 5	yeux 4 3	Lo,3		grap O	Grappe Four : Baie :	: G - Cdisc-spr: B-C: s - : avec	M - P Mil Gr-Rs- m - apy	Dim 1: - P I -ov-ol Rg-N r - fo	début Dim: Dov-cyl	Compac L-fus inc -	zité	: L - ::- C

MOM graciana

DMPLACEDERE & R7 AM. MS

iche	Nbre yeux		rrement mi/déb	Ferti- lité		raison mi/E		Või début	raison mi/v	Maturité.
1 2 4 5	4 3.	h13	M.3. 18.3. 6 (-5)	Couleu Saveur Pépins Fort :	TG - disc-s r : P-C r s -	Mil. i - M - sph-eli ir-Rs-l m - a	L: - P D. 1-ov-c Rg-N r - fe	im : obov-cy <u>Jus</u>	/l-fus : inc	1, - 14 -C

AMMETE: 1997 WOM graciana					EMPLACIONETT 8R43 111-115.								
che	Whre yeux	bre Debourragent cux debut mi/deb			Ferti-	t lo dobúř	ratson	fin	Véraison debut mi/v fin u			Hatur 116	
1	H	282	103	3		2.2k	265	195	4.8	11.8	188	29,9	
,		24.2	103	3	. , , , ,		+10			+5		+90	
-	·.				Grappo	: ::	п - г	Dim	•	Compa	:ité	± (J	
	3	282	713	1 8	Four :		Mil						
	9 TL	7.3	713	8	Bale: To G . H - P Dim:								
	1		7.3.97		Coulem	i 11-0	n - Rg-1	R(1-14	dus :	fne -	. (1)	016	
		Dle	7.3.97		Saveur				эх — he	r)			
					Fört:	1 2300	· apy						
			+4					V ,1.	gueur	:			

Andt Oliva Oliva el 8 R7 s m. 115 A. 5 N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182/- moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 160/- sans villosité pubescente 278/- sans villosité laineuse 279.

Blanc 161) - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

identanlantanlantanlandari

Etalées - en goutfière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 }- sans villosité pubescente 280 / sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 /- autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 2(8) - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 2/82 sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 2(24) - cotonneux 2(5) - sans villosité pubescente 2/84 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 2/33)

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 288) - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 92

N° d'ordre :

Désignation :

Graciana 8 R70-111-115015

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

dentimbatardantadantad

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -

séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.

sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: colore 264 - vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 95

-Graciana 8 R70-111-115.0.5

dontadontodadontodadontod

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142) - grande 143

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

<u>limbe</u>: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calvo 94

Année 1998

Observateur: Lacombe

dantadantadantadantad

Code cepage

Nom cépage : Graciana

Juntandanda

Emplacement 8R73111-115

Grappe

```
oiv 202 longueur : très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 3 - longue
(20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9.
oiv 203 largeur : très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 moyenne (10-15cm) 5 - large (15-
20cm) 7 - très large (>20cm) 9
oiv 204 compacité : très lâche ①- lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9.
oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3)- moyen (4-7cm) 5 - long (7-
10cm) 7 - très long (>10cm) 9.
oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7
```

ojy 208* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2

oiv 209* présence d'un aileron : absent 1 - une aile 2 deux ailes 3 - plus de deux ailes 4.

Baie

```
oiy <u>220 longueur</u>: tres courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyeme (14-20mm) 5 - longue
(20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9.
oiv 221 largeur très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5)- large (20-
26mm) 7 - très large (>26mm) 9.
oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1)- uniforme 3
oiy 223 forme aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoide 4 - troncovoide 5 - obovoide 6 -
ylindrique 7 - arquée 8.
biy <u>225</u> couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 60
siv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme(2)
oiv 227 pruine nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne (5)- forte 7 - très forte 9.
oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne(5) - épaisse 7 - tres épaisse 9.
oiv 229 ombilic : peu apparent(D- apparent 2.
oiv <u>230</u>* coloration de la pulpe : non coloré (1)- coloree 2.
oiv 231 intensité coloration pulpe non coloree 1) - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 -
torte coloration 7 - très forte coloration 9.
oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2)
oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 élevé (>75) 7
oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9.
oiv 236 saveur : aucune(l)- goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbace 4 - goût spécial 5
oiv 236* saveur : aucune(1)- goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4
oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm)(3)- moyen (8-12mm) 5 - long
(12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9
oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen(5)- difficile 7 - très difficile 9
oiy 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents(3)
oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. 5-6
oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) très faible (~10mg) 1 - faible (25mg) 3 -
moyen (40mg) > - élevé (55mg) 7 - très élevé (~65mg) 9.
oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins—absentes(D- presentes 2
```

GRACIANA 8 R7 A.111-11570-4

alantan kintan lantan lantan l

DENOMINATION :

Auntonilinite

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2) Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé(2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).